© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malacozoologischen Gesellschaft.

N. B. Die Preise in Reichsmark per Stück.

	ℳ		ℳ
Cyclostomus Banksianus, Sow., v. hyacinthium, C. B. Ad. Jamaica.	0,40	Lucidella aureola, v. granulosa, C. B. Ad., Jamaica.	0,30
— Jayanus, C. B. Ad. „	0,40	Proserpina nitida, Sow., „	0,50
— Jayanus, v. rufilabre, C. B. Ad. Jamaica.	0,70	Trochatella pulchella, Gray, Jamaica.	0,25
Megalostoma antillarum, Sow. St. Thomas.	0,60	— pulchella v. parra „	0,30
Registoma grande, Say. Philipp.	0,40	Helicina Adamsiana, Pfr., Jamaica.	0,25
Dermatocera vitrea, Less. Ternate.	0,50	— jamaicensis, Sow., „	0,30
Cyclotus seminudus, C. B. Ad. Jamaica.	0,60	— neritella, Lam., „	0,30
— translucidus v. trinitensis, Trinidad.	0,75	— barbata, Guppy, Trinidad.	0,30
— rugatus, „	0,75	— acutissima, Sow. jun., Bohol.	0,30
— grenadensis, Shuttlew. Grenada.	0,75	Alcadia Hollandi, C. B. Ad., Jamaica.	0,25
Choanopoma fimbriatum, Sow. Jamaica.	0,35	— palliata, C. B. Ad., „	0,35
— fimbriatum v. album „	1	— major, Gray, „	0,50
— pulchrum, Wood „	1	Adamsiella grayana, Pfr., „	0,75
Chondropoma crenulatum, Fér. Guadaloupe.	0,50	— variabilis, C. B. Ad., Jam.	0,50
— Newcombianum, C. B. Ad. St. Thomas.	0,50	Helix carseolana Fer. Subiaco.	0,30
— claudicans, Poey. Cuba.	0,70	— tuberculosa Conr. Palästina	0,50
Tudora columna, Wood, Jamaica	0,75	— vestalis Parr. „	0,30
— armata, C. B. Ad. „	0,60	Leucochroa candidissima var. hierochuntina Boiss.	0,30
— megacheila, P. & M. Curaçao.	0,60	Bulimus septemdentatus Roth, Palästina.	0,30
— Augustae, C.B. Ad. Jamaica	0,60	— Cantori Phil. China.	0,50
— Adamsi, Pfr. „	0,50	Clausilia fusca de Betta Oberit.	0,20
Cistula Sauliae, Sow. „	1	— leucostigma Zgl. Mittelit.	0,20
— aripensis, Guppy, Trinidad.	0,60	Melanopsis jordanica Roth Jordan.	0,30
— pupaeformis, Sow. Anguilla	0,50	Paludina okaënsis Clessin Oka.	0,30
— bilabris, Mke. St. Thomas.	0,50	— praerosa Gerstf. Amur.	0,60
Blandiella reclusa, Guppy, Trinidad.	0,75	*Seeconchylien vom Rothen Meer wo nicht anders bemerkt; die näheren Fundorte auf den Zetteln.*	
Lucidella aureola, Gray, Jamaica.	0,25	Plicatula ramosa, Lm.	0,50
		Mactra fuscata,	1
		Mactra decorata, Desh.	2

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	M.
Lucina Fischeriana,	0,30
Strigillina lactea, Dkr.	1-1,50
Tellina opalina, Sow.	0,50
Donax Dohrni, Jick.	0,50-1
— trifasciata, Reeve.	0,50
Artemis cretacea, Reeve.	0,50
— alta, Dkr. var.	0,30
Turbo (Lunella) Hempr. Tros.	1,50
Cerithium variegatum, Q. & G.	0,20
— moniliferum, Drp.	0,30
— obeliscus, Brug.	0,20
— erythraeense, Lam.	0,50
Conus acuminatus, Brug.	3
— — v. grossa.	0,50
— — v. unicolor.	4,50
— arenatus, Brug. Kl. & Gr.	0,20-0,40
— classiarius, Brug. do.	0,80-1,50
— Deshayesi, Reeve.	2
— erythraeensis, Bk.	0,80
Triton trilineatum, Rve.	1
Pyrula rapa, Lam.	0,50
Murex foraminiferus, Tapp. v.	1
— rota, Sow.	4-6
— digitatus Sow.	15
Mitra harpaeformis, Reeve	0,20
Plecotrema rapax, Dohrn	0,40
Scaliola elata, Semper	0,10
Laemodonta affinis, Desh.	0,40
Atys cylindrica, Helb.	0,20
Truncatella teres, Pfr.	0,10
— semicostulata, Beck	0,60
Cassidula nucleus, Martyn	0,20
— labrella, Desh.	0,30
Melampus massauensis, Pfr.	0,10
— siamensis, Martyn	0,10

Marine-Conchylien von Westindien, wenn nicht anders bemerkt; die nähern Fundorte auf den Zetteln.

Ostrea rubella, Lam. von Mangrove Zweigen	0,30
Ostree parasitica, Gmel. von Brettern etc.	0,25
Ostrea plicatula, Gmel.	0,75
Plicatula ramosa, Lm.	0,35
Perna bicolor, C. B. Ad.	0,60
Vulsella elongata und var.	0,50
Pecten ziczac, Chem.	1
— subnodosus, Sow.	3
— japonicus, Gmel. Japan.	3
Lima scabra, Born	0,50-2
Mytilus perna, Lam. Rio Janeiro.	0,50
— exustus, Lam.	0,40
— brasiliensis, Chm.	0,30
Modiola americana, Leach.	0,50
Lithodomus lithophagus, L.	0,40
Pectunculus pallium, Reeve.	0,80
Arca Noae, L. St. Thomas	0,25-0,80
— occidentalis, Phil.	0,50-1
— incongrua, Say	0,40-0,80
Lucina tigerina, L.	0,20-1
— occidentalis, Phil.	0,30-0,80
— muricata, Spnglr.	1
— scabra, Lam.	0,25-0,60
— antillarum, Reeve und var. ornata, C. B. Ad.	0,40-0,60
— pecten, Lam.	0,60
— aurantia, Desh.	0,60-1
— jamaicensis, Lam.	0,50-0,80
— globosa,	1
Tellina bimaculata und v., L.	0,20-0,40
— punicea und var., Born	0,30-0,50
— alternata, Say	0,30-1,50
— fausta, Don.	0,40-1
— interrupta, Wood	0,75-1,50
— radiata, L.	0,60-1,50
Donax denticulata, Lam.	0,30
— serra, Vorgebirge der guten Hoffnung	4
Strigilla pisiformis, L.	0,10
— — v. alba	0,10
— carnaria, Lm. und var.	0,50-1
Chama macrophylla, Chem.	0,60-1,50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Asaphis coccynea, Martyn und var.	0,40-0,80
Amphidesma (Semele) reticulata, Lm.	0,50-0,80
Papyridea bullata, L.	1-2
Venus granulosa, Lm.	0,50-0,70
— ziczac, L.	0,50-0,75
— paphia, L.	0,75-1
— Dione, L.	1-1,50
— asperrima, Sow.	0,50-0,70
— flexuosa, Lam.	0,40-0,60
— mercenaria,L. Newyork.	
— maculata, L.	2
Circe minima, Mont.	0,50
Cardium, muricatum, L.	0,30-0,50
— haitense, Say	0,50-1
— oviputamen, Reeve	0,50-0,80
— subelongatum, Sow.	1
Cardita (Lazaria) gracilis, Shuttlew.	0,50-1,50
— dactylus, Brug. Trinidad	2
Mactra alata, Spengl.	4
Solecurtus floridanus, Cour.	1,50
Pholas caribea, D'Orb.	0,25-0,50
Neaera ornatissima, D'Orb.	1,50
Corbula Lavalleana, D'Orb.	0,20
— Knoxiana, C. B. Ad.	0,40-0,80
— Kjaeriana, C. B. Ad.	0,50-0,80
— Barrattiana, C. B. Ad.	1
Periploma inequivalvis, Schum. W.-I.	3,50
Dentalium antillarum D'Orb	0,50
— politum, L.	0,50
Chiton occidentalis, Reeve (Salamander, Spengl.)	0,50-0,80
— squamosus, L. (undatus, Spengl.)	0,60-0,80
— acutiliratus, Reeve	0,30-0,50
Patella melanosticta, Gmel.	0,20-0,30
— pustula, Helbrich	0,20-0,40
Siphonaria lineata, D'Orb.	0,20-0,40
Tectura leucopleura, Gmel.	0,30-0,50
Fissurella viridula, Lm.	0,30-0,50
Fissurella nodosa, Born	0,30-0,50
Calyptrea Jamaica	0,10-0,20
Crepidula aculeata, Lam.	0,20-0,40
— unguiformis Lam.	0,20-0,40
Trochus pica, L.	0,20-0,50
— excavatus, L.	0,25-0,40
— carneolus, Lam.	0,20-0,40
Modulus antillarum, Chm.	0,10-0,30
— perlatus, Gmel.	0,40-0,50
Xenophorus conchyliophorus, Born	1,50-5
Astralium calcar, L.	2-5
Litorina muricata, L.	0,10-0,30
— nodulosa, Gmel.	0,10-0,20
— ziczac, Chm.	0,10-0,20
— — v. carinata, D'Orb.	0,10-0,20
— angulifera, Lm.	0,20-0,30
Planaxis semisulcata, Born.	0,20-0,30
— lineatus, Da. Cos.	0,10-0,20
Litiopa melanostoma, Rang. Sargasso Tange	0,40
Rissoa elegantissima, D'Orb.	0,10-0,20
Caecum regulare, Carp.	0,10
— imbricatum, Carp.	0,20
— cornu-bovis, Carp.	0,10
— nitidum Carp.	0,20
Neritina viridis, L.	0,20
Cerithium eriense, Val.	0,10
— minimum, Gmel.	0,25
— atratum, Gmel.	0,20
— litteratum, Brug.	0,20
— gibberulum, C. B. Ad.	0,20
— striatissimum, Sow.	0,30
Cerithidea ambigua, C. B. Ad.	0,20
Turbo hyppocastaneus, Lam.	0,50-0,80
— tuber, L.	0,60-1
Natica lactea, Guilding	0,10-0,30
— canrena, L.	0,20-0,40
— fuscata, Chem. Panama	1
Nerita variegata, Chm.	0,10-0,30
— versicolor, Lm.	0,10-0,40
— peloronta, L.	0,50-1
Mitra barbadensis, Gmel.	0,50-0,80

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Conohelix marmorata, Sw. Pelew-Ins.	0,50
Cancellaria reticulata, Dillw.	1.50
Pyramidella (Obeliscus) dolabrata, L.	0,30-0,50
— terebellum, Müll.	0,20-0,30
Terebra cinerea, Born	0,50-1
— hastata, Gmel.	0,30-0,60
Columbella mercatoria, L.	0,10
— cribraria, Sow.	0,10-0,20
— nitida, Lam.	0,10-0,20
Marginella pallida, L.	0,10-0,20
Volvaria avenacea, Klein	0,10-0,20
Conus columba, Hwass.	0,10-0,30
— verrucosus, Hwass.	0,10-0,30
Ovula gibbosa, L.	0,20-0,30
Trivia pediculus, L.	0,10-0,20
— suffusa, Gray	0,10-0,20
— vitrea, Gaskoin	0,20-0,30
— subrostrata, Gray	0,20-0,30
Olivella oryza, Lm.	0,10
— — var.	0,20
Oliva reticularis, Lm.	0,10-0,20
Marginella interrupta Sol.	0,30
Ancillaria (Dipsacus) glabrata, L. Curaçao	2-3
Purpura patula, L.	0,30-0,70
— trapa, Bolten	0,40-0,80
— undata, Lm.	0,20-0,50
Pisania coromandeliana, Lm.	0,40-0,60
— aurita, L.	0,30-0,50
Turbinella nassa, Gmel.	0,20-0,40
Fasciolaria tulipa, L.	0,80-6
Pyrula melongena, L.	0,80-3
Nassa antillarum, D'Orb.	0,20-0,40
Phos textilinum, Mörch.	0,40-0,60
Cassis testiculus, L.	1-2
Oniscia oniscus, Lam.	0,50-0,80
Triton tuberosum, Gmel.	0,20-0,30
— femorale, Lm.	0,50-1
— pileare, Lam.	1
Murex pomum, Gmel. c. op.	1-2.50
— calcitrapa, Lm. c. op.	1-1.50
Strombus gigas, L. c. op.	6
— accipitrinus, Lm. c. op.	4
— pugilis, L. c. op.	1-2
Bulla striata, Brug.	0,10-0,30
— naucum, L. Ostindien	0,30-0,60
Stiliola vitrea, Dkr. N. sp. Desterro	0,20

Conchylien von Abyssinien und Egypten.

Helix desertella, Jick.	0,60
— obstructa, Fér.	0,20
— Darnaudi, Pfr.	1
— desertorum, v. inflata	0,20
— — v. depressa	0,20
Pupa Klunzingeri, Jick.	0,50
— lardea, Jick.	0,50
— Reinhardti, Jick.	0,50
— fontana Krss.	0,50
— bisulcata, Jick.	0,50
Clausilia socialis, Friv.	0,20
Bulimus insularis, Ehrenb.	0,20
Succinea striata, Krss. var. limicola Morel	0,20
Unio aegyptiacus u. var.	0,40
Corbicula consobrina, Fér.	0,80
— fluminalis, var.	0,10
— radiata, Phil.	0,20
Cleopatra bulimoides, Olivi	0,10
Isidora sericina, Jick.	0,60
Ancylus abyssinicus, Jick.	0,20
Vivipara unicolor, Oliv.	0,20
Lanistes carinatus, Oliv.	0,80
Spatha Caillaudi, Mart.	0,50-2

Europäische See-Conchylien fortgesetzt.

Rissoa Jeffreysi, Waller	0,30-0,50
Odostomia albella, Sow.	0,30-0,50
Trochus umbilicatus, Mont.	0,10-0,20
— — v. agathensis, Recl.	0,10-0,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	ℳ		ℳ
Saxicava rugosa, v. pholadis, L.	0,40-0,80	Sepia officinalis, L.	0,20-0,50
Lutraria oblonga, Chem.	0,60-1.50	Mactra solida, L.	0,10-0,30
Tellina pusilla, Phil.	0,20-0.30	— — v. elliptica, Br. juvenis. 6 Stück	0,30
Cardium exiguum, Gmel.	0,30-0,60	Psammobia vespertina, Ch.	0,30-0,50
Axinus croulinensis, Jeffr.	0,30-0,40	Isocardia cor., L.	1.50-3
Nassa reticulata, L.	0,30-0,60	Arca nodulosa, Müll.	1-2
Homalogyra atomus, Phil.	0,50-1	Argonanta argo, L., Gross	6-12
Trochus exasperatus, Penn.	0,10-0,30	Scissurella crispata, v. borealis, Sow.	1
— striatus, L.	0,10-0,30		
Haliotis tuberculata, L.	0,30-1	Solen pellucidus, Penn.	0,20-0,40
Hyalea tridentata, Forck.	0,20-0,50		

Eine Sammlung britische Land-, Süsswasser- und See-Conchylien, so gut wie complet, meist in langen Reihenfolgen, woran über 20 Jahre gesammelt ist; Catalog besagt das Nähere . . . . . £ 150

Eine Sammlung europäischer See-Conchylien, enthaltend hauptsächlich englische, norweger, isländische etc., viele in längerer Reihenfolge, über 900 Arten und Varietäten . . . . . £ 100

Eine Sammlung Uniohidae von ca. 800 Arten und Varietäten aus allen Weltgegenden . . . . . £ 40

Eine Anzahl japanesischer See-Conchylien von A. Adams, meist von seinen kleinen interessanten Arten, viele nicht mehr zu haben, etwa 160 Species . . . . . £ 12

Literatur-Bericht.

Jeffreys, Gwyn, Submarine Cable Fauna. In: Annals and Magazine of Natural History, March 1875.

Es handelt sich um das Kabel von Falmouth nach Lissabon, das in 1870 gelegt und im Herbst 1874 einer Ausbesserung wegen zwischen 47° 58′ und 47° 35′ nördl. Br. und 7° 6′ westl. Länge aus einer Tiefe von 89—205 Faden wieder aufgenommen wurde. Folgende Molluskenarten fanden sich daran befestigt (die gesperrt gedruckten lebend): Terebratula caput serpentis, Anomia ephippium, Ostrea cochlear, zu der O. rosacea Desh. als Varietät gezogen wird, Pecten opercularis, similis, Lima subauriculata, Loscombii, Avicula hirundo, Mytilus phaseolinus, Kellia suborbicularis, Axinus cycladius, Cardium minimum, Astarte triangularis, Circe minima, Venus ovata, Tellina pusilla, Mactra solida var. elliptica; — Cyclostrema nitens, Trochus millegranus, Rissoa soluta; Triforis perversa. Zusammen 21 Arten.

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. XXVI. Heft 4. p. 741. von Martens, fossile Süsswasserconchylien aus Sibirien.